

Рекомендации после операции костной пластики

1. Воздержаться от приема пищи, пока не пройдет анестезия;
2. Воздержаться от приема горячей пищи и напитков в течении суток, стараться принимать пищу на противоположной стороне в течение 7 дней.
3. Чистить зубы, в послеоперационной зоне чистка производится мягкой зубной щеткой, выметающими движениями от десны к зубу, без давления на десну;



4. Не пытаться самостоятельно снять швы;
5. В течение 3х суток избегать физических нагрузок, переохлаждения или перегрева, не ходить в баню, не греть больную щеку грелкой или компрессом;
6. При болях рекомендуется прием обезболивающих, назначенных врачом;
7. В случае сохранения боли одинаковой интенсивности более 3х суток обратиться к врачу;

8. Кровотечение в течение первых суток или примесь крови в слюне - это нормально, при сильном кровотечении, либо при продолжающемся кровотечении более суток, обратиться к врачу.
Воздержаться от приема кроворазжижающих препаратов в течение суток после удаления. Если есть гипертоническая болезнь, первым делом измерить АД, в случае повышения принять гипотензивные препараты, назначенные вашим лечащим врачом. И приложить холодный компресс к щеке в зоне удаления, интервально по 5 минут с перерывом 3 минуты, в течение часа (только первые сутки).
 9. Отек в раннем послеоперационном периоде может нарастать в течение 3х суток, далее он идет на спад;
 10. В случае установки имплантата, формирователя десны или временной коронки воздержаться от жевания на них, в течение срока остеоинтеграции имплантата. При появлении подвижности - немедленно обратиться к лечащему врачу;
 11. В случае появления боли после снятия швов, в период «приживления» имплантата - обратиться к врачу.
-
-
-

Лечащий врач

Дата